



Дом здравља Горњи Милановац

Прихваћено:	16.01.2018	
Фрм. јед.	Број	Прилог
	7175/110	

МБ: 17776037
ПИБ: 106106068

Процедура за постављање брауниле интравенског катетера

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
6.28	20. 12. 2017	
Израдио мед. сестра Вера Радовановић	Контролисао	
Тим Службе за здравствену заштиту одраслог становништва	Dr Владимир Миловић Владимир Миловановић спец. педијатрије II 17004365	



ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БРАУНИЛЕ-ИНТРАВЕНСКОГ КАТЕТЕРА

1. ЦИЉ процедуре је да утврди начин и поступак приликом постављања интравенског катетера

2. ДЕФИНИЦИЈА

Интравенска канила или катетер који уводимо у вену због потребе бржег, лакшег и ефикаснијег давања интравенских инјекција и инфузија.

1. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена свим медицинским сестрама – техничарима запосленим у Дому Здравља Горњи Милановац и примењује се у свим службама где се апликује интравенозна терапија

2. Поступак

1. Постављање брауниле:

- Припремити пацијента, поставити га у удобан положај
- Опрати руке, ставити рукавице
- Припремити браунилу
- Поставити повеску 10 центиметара проксимално од места убода
- Дезинфиковати место убода
- Затегнути кожу и под углом од 15 степени пунктирати вену, када се добије крв повући метални део каниле док се њен пластични део гура на место – у лумен вене
- Одвезати повеску
- Фиксирати браунилу леукопластом и на њему написати време и датум постављања
- Дати прописану терапију

2. Мере предострожности:

- Примена асептичних услова
- Одабир места убода (изабрана вена би требало да буде лако доступна и да пацијент може неометано да покреће екстремитете)
- Браунила се користи, по правилу, 48-72 сата
- Хепаринизација брауниле

3. Опрема:

- Интравенска канила - браунила
- Инфузиона пумпа са прошприцаним системом и именом пацијента
- Дезинфекционо средство и тупфери



- Есмархова повеска
- Фластер
- Папирна вата и мушема
- Бубрежњак и рукавице

4. Нег:

- Свакодневно мењање бандаже и праћење места убода (да ли постоји иритација, флебитис...)
- Промена бандаже ако је запрљана
- Дезинфекција коже
- Оджавање проходности хепаринизацијом на сваких 8 сати осим код пацијената који су на антикоагулантној терапији

5. Вађење интравенске каниле – брауниле

Место инсерције заштитити сувим стерилним тупфером и применити компресију на испруженој руци неколико минута.

3. Одговорност

Одговорна за спровођење процедуре је медицинска сестра – техничар која поставља браунилу – интравенски катетер.

Одговорни за контролу процедуре су начелници служби, шефови одељења главне сестре служби и одговорне сестре одељења.

4. Референтни документи и записи

- Налог за терапију
- Протоколи пацијената
- Здравствени картон пацијената