




ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Процедура:	17. 11. 2021.	
Ост. број:	7173/	Према:
	292	

ПРОЦЕДУРА
ЕДУКАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА ЗА САМОПРИМЕНУ
НИСКОМОЛЕКУЛАРНИХ ХЕПАРИНА

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
6.44	29.10.2021.	
Израдио мед. сестра Мира Росић	Контролисао 	
Тим Служба за здравствену заштиту одраслих		



1. ЦИЉ

Циљ процедуре је дефинисати поступак едукације пацијента за самодавање нискомолекуларних хепарина.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у интервенцијама свих организационих јединица Службе за здравствену заштиту одраслог становништва.

3. ДЕФИНИЦИЈА

Налог за терапију нискомолекуларним хепаринима прописује изабрани лекар. Лекар информише пацијента да ће бити едукован од стране медицинске сестре за самопримену нискомолекуларног хепарина. Лек спречава згрушавање крви и смањује опасност стварања тромба.

4. ОДГОВОРНОСТ

Одговорни за спровођење процедуре су одговорне медицинске сестре и медицинске сестре које раде у интервенцијама.

Одговорни за контролу спровођења процедуре су одговорне медицинске сестре, главна медицинска сестра, шефови одељења и начелник службе.

5. ПОСТУПАК

Напуњени стерилни шприцеви са иглом су намењени за самодавање. Уобичајено место давања инјекције је спољни зид трбуха, најмање пет центиметара поред и испод пупка. Као алтернативно место може се користити бутина.

- Пацијент опере руке водом и сапуном, затим их осуши пешкиром.

- Заузме одговарајући удобан седећи или полуседећи положај

- Изврши дезинфекцију места давања инјекције ватом натопљеном у алкохолу.

- Извади напуњен инјекциони шприц из пвц блистера.

- Скине штитник игле окретањем и праволинијским повлачењем дуж игле и одложи га.

- Ваздушни мехурић се не уклања из напуњеног шприца.

Једном руком се нежно направи набор коже места где је извршена дезинфекција и то између палца и кажипрста, а другом руком се држи шприц између палца и средњег прста и под правим углом се уводи игла целом дужином у набор коже. Кажипрстом се притисне клип шприца до краја. Убризгава се целокупан садржај шприца.

Сачека се бар три секунде пре извлачења игле. Игла се лагано извуче и пушта се набор коже. Ватом се лагано пређе преко места убода.

Након апликације лека на сиретама где постоји активација заштите игле, изврши се активирање тако што се једном руком држи део шприца ширег улаза клипа а другом



повлачи заштитна навлака у смеру ка игли. Када се чује клик заштитна навлака је покрила иглу.

Приликом примене саветује се мењање леве и десне стране трбуха. Убризгавање лека може изазвати печење. То није необично и може се ублажити тако што се садржај сирете убризга лаганије. Врло витки или мишићави пацијенти инјекцију убризгавају под углом од четрдесет пет степени. Инјекција се даје увек у исто доба дана.

Употребљене сирете се одлажу у одговарајући непробојни контејнер који је пацијент у обавези да врати у организациону јединицу у којој му је терапија издата.

Код пацијената којима се ове инструкције учине некомфорне, врши се едукација чланова породице или особе која води бригу о пацијенту.

По извршеном програму едукације врши се издавање одређеног броја сирета, у зависности од потребе пацијента и бројног стања у апотеци.

7. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол о пријему налога од изабраног лекара.

Налог за ампулирану терапију са евиденцијом издавања сирета нискомолекуларних хепарина (одељак подаци о давању ињекција)