



ДОМ ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Примљено:	26.01.2018	
Орг. јед.	Број	Прилог
	7175/	146

ПРОЦЕДУРА ПРУЖАЊА ПРВЕ ПОМОЋИ КОД КРВАРЕЊА

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
9.26	01.12.2017.	
Израдио др Биљана Јевтовић доктор стоматологије	Процедуру оверио <i>Dr Petro Jozo</i>	
Тим за акредитацију стоматолошке службе		

1. ЦИЉ

Овом процедуром утврђује се редослед и садржај поступака приликом указивања прве помоћи код крварења.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – свим тимовима стоматологије.

3. ДЕФИНИЦИЈА

Интервенција се врши у циљу заустављања крварења и спречавања настанка компликација које могу бити опасне по живот пацијента.

4. ОДГОВОРНОСТ

4.1. Одговорни за контролу ове процедуре су начелник службе и сви изабрани лекари.

4.2. Одговорни за спровођење ове процедуре су начелник службе и сви тимови стоматологије.

5. ПОСТУПАК

5.1 Кад се пацијент са крварењем јави у Службу за стоматолошку здравствену заштиту, прима се по процедури за хитне случајеве .

5.2. Доктор који је примио пацијента прегледом утврђује који је узрок крварења и у зависности од тога одређује даљу терапију.

5.3. Обавештава пацијента о нађеном стању и предлаже интервенцију и терапију.

5.4. Узроци крварења у стоматолошкој пракси су углавном вађење зуба или повреде. Крварења после повреда се санирају по прецедури за санирање повреда. Крварење после вађења зуба санира се одређеним поступцима у зависности од узрока крварења (повређена гингива, повређен крвни суд, поломљен део алвеоле). Крварења од повређене гингиве нису обилна и престају после тампонаде ране стерилном газом. Крварења од повређеног крвног суда или повређене алвеоле су дуготрајна и упорна и заустављају се једном од следећих метода:

-биолошка метода (гелатамп)

-хемијско-механичка метода (тампонада ране јодоформ штрајфом или завојем ZnO)

-механичка метода(тампонада ране стерилном газом).

Уколико крварење не престаје, даје се налог за примање ампулиране терапије (dycinone) .

5.5. Примењује се нека од наведених метода .

5.6. Пацијент је наредних пола сата до сат времена под контролом доктора који прати процес заустављања крварења.

5.7. Уколико је крварење престало, пацијент се отпушта из амбуланте уз дат савет.

5.8. Уколико крварење није престало, пацијент се са упутом шаље у установу вишег нивоа са назнаком хитно.

5.8. Све се ово евидентира у картону пацијента и протоколу и у протоколу хитних стања.

6. ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Упут изабраног стоматолога

6.2. Медицинска документација и евиденција