



ДОМ ЗДРАВЉА  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ  
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Примљено: 06.3.2018.		
Орг. јед.	Број	Прилог
	7175/158	

## ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕЊА ПУЛПИТА МЛЕЧНИХ ЗУБА

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
9.33	19.11.2017.	
Израдио др Биљана Јевтовић доктор стоматологије	Процедуру оверио	
Тим за акредитацију стоматолошке службе		



## 1. ЦИЉ

Овом процедуром утврђује се редослед и садржај поступака у лечењу запаљења садржаја канала корена млечног зуба.

## 2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – свим тимови стоматологије.

## 3. ДЕФИНИЦИЈА

Интервенција се спроводи у циљу санирања каријеса зуба и враћања функције зуба.

## 4. ОДГОВОРНОСТ

4.1. Одговорни за контролу ове процедуре су начелник службе и изабрани лекари.

4.2. Одговорни за спровођење ове процедуре су начелник службе и сви тимови у стоматологији.

## 5. ПОСТУПАК

5.1 Пацијенти са овим обољењем спадају у хитно стање јер ово обољење карактеришу јаки болови, који су спонтани, који дуго трају и често су ноћни болови. Због специфичности грађе млечних зуба (широки дентински каналићи) запаљење лако може да пређе у неко озбиљније стање па је потребно брзо одреаговати.

5.2. При првој посети пацијент се прима као хитно стање и на зуб се ставља средство за заустављање болова. Пацијент се даље заказује код свог изабраног лекара.

5.3. После 2-3 дана пацијент се јавља свом изабраном лекару који од стања зуба одлучује коју ће методу у лечењу пулпита да примени. Обично је то девитализација зуба која се спроводи стављањем средства за девитализацију.

Могуће је урадити и виталну ампутацију пулпе млечног зуба где се да анестезија, отклони комора пулпе и стави лек на бази  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{ZnO}$  и стави дефинитивни испун.

Оно што је најбитније у овом случају је да се по годинама детета одреди стадијум пулпе млечног зуба. Ако је зуб пред смену, део корена је ресорбован и зубна пулпа нема регенеративну моћ (дегенеративни стадијум пулпе), тада нема потребе радити било који од поменутих захвата већ само треба отворити зуб.

5.4. Уколико смо ставили средство за девитализацију, морамо имати у виду да због специфичности грађе млечног зуба лек стоји упола краће него код сталног зуба.



5.5. При следећој посети уради се мортална ампутација пулпе, стави се паста за мумифицирање пулпе и  $ZnO$ , и ставља се дефинитивни испун.

5.6. Код деце се екстирпација нерва ретко примењује због отежаних услова рада код деце.

## 6. ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

### 6.1. Медицинска документација и евиденција