



ДОМ ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

| | | |
|------------|-----------|--------|
| Пацијент | 06.3.2018 | |
| Служба | Зуб | Прилог |
| 7175 / 166 | | |

ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЂЕЊЕ МЛЕЧНИХ ЗУБА

| Број процедуре | Датум израде процедуре | Датум измене процедуре |
|---|------------------------|------------------------|
| 9.41 | 19.11.2017. | |
| Израдио др Перо Лозо доктор стоматологије | Процедуру оверио | |
| Тим за акредитацију стоматолошке службе | <i>Dr Pero Lazo</i> | |

1. ЦИЉ

Овом процедуром утврђује се редослед и садржај поступака приликом вађења млечних зуба.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у Служби за стоматолошку здравствену заштиту –тимовима превентивне и дечије стоматологије и изабраним лекарима и њиховим тимовима.

3. ДЕФИНИЦИЈА

Процедура дефинише поступак рада приликом наведене интервенције и санирање могућих компликација.

4. ОДГОВОРНОСТ

4.1. Одговорни за контролу ове процедуре су начелник службе и изабрани лекари.

4.2. Одговорни за спровођење ове процедуре су начелник службе и тимови који пружају ову услугу.

5. ПОСТУПАК

5.1. Вађење млечних зуба индиковано је у периоду смене зуба. Такође може бити индиковано у припреми за ношење ортодонтског апарата кад би млечни зуб или заостао корен млечног зуба сметао при ношењу протезе(по захтеву ортодонта). Анкилозирани зуби као и зуби који дају честе отоке су индиковани за вађење.

5.2. Пре вађења млечног зуба који је у смени није потребно радити Ро снимак. Али уколико се зуб вади из ортодонтских разлога а у питању су млечни молари чији коренови нису ресорбовани, потребно је урадити Ро снимак да би се видео однос коренова млечних молара са заметцима сталних зуба да би се избегле могуће компликације .

5.3. Вађење млечних зуба се углавном ради у површинској анестезији, међутим код зуба код којих нису ресорбовани коренови, зуби се ваде у локалној анестезији уз претходно површинско анестезирање места апликације(убода).

5.4. По анестезирању одређене регије уста приступа се вађењу зуба. Стерилни инструменти (кљешта, полуге, кирете) стоје у касетама и узимају се стерилном пинцетом.

5.8. Техника вађења зуба разликује се од зуба до зуба у зависности од броја коренова зуба као и облика коренова зуба.

5.9. После вађења зуба приступа се заустављању крварења одговарајућом методом.

5.10. Пацијенту се дају савети о режиму после вађења зуба.

5.11. Компликације вађења зуба санирају се по постојећим процедурама.

6. ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Упут ортодонта за вађење зуба

6.2. Упутство за пацијенте после вађења зуба

6.3. Медицинска документација и евиденција

6.4. План терапије