



ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
БРОЈ : 4854
ДАТУМ : 16.06.2020.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од 16.06.2020. године задужују се руководиоци организационих јединица да се придржавају стручно-методолошког упутства које се налази у прилогу овог обавештења, заведено под бројем 4811 од 15.06. 2020. и упознају све запослене у организационој јединици којом руководе. Сви запослени здравствени радници су дужни да се придржавају процедура дефинисаних у стручном методолошкјом упутству које се налази у прилогу почев од 16. 06.2020. Свако не поступање по упутству, односно одступање од истог, сматра се повредом радне обавезе. За све нејасноће контактирати поноћника директора др Маријану Манојловић.

в.д.директора Дома здравља
др Александар Чивовић



Горњи Милановац
Општина Горњи Милановац



ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“

Датум издања: 15.06.2020.	Број издања:	Број:	Слово:
		4811	

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„Др Милан Јовановић Батут“
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија
<http://www.batut.org.rs>

Телефон централа: 011-2684-566
Број рачуна: 840-624661-88

Факс: 011-2685-735
Матични број: 07036027

Електронска пошта: kabinet@batut.org.rs
ПИБ: 102000930

**КРИЗНИ ШТАБ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 НА 28.
СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 13. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ, ДОНЕО ЈЕ ЗАКЉУЧАК**

1. У Стручно-методолошком упутству за контролу уношења и спречавање ширења новог корона вируса SARS-COV-2 у Републици Србији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, усвојен од стране Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 6. априла 2020. године, **ПРИЛОГ 17. COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**, мења се и спроводи према следећим инструкцијама:

COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

А. Тестирање RT-PCR методом о трошку државе укључује следеће групе:

1. **Хоспитализовани пацијенти** – пацијенти који су хоспитализовани због тежине клиничке слике основне болести, а код којих се током хоспитализације појаве симптоми респираторне инфекције, без обзира да ли су имали контакт са потврђеним случајем COVID-19;
- Место узорковања: болнице
2. **Особе са симптомима акутне респираторне болести** [повишена температура (>37 С°) и један од клиничких знакова и симптома кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање], без друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести:
 - а) У случају блиског контакта (мање од 1 метар) у трајању дужем од 15 минута са особом код које је потврђено присуство SARS-CoV-2
Одлука о тестирању RT-PCR се базира на клиничкој слици, радиографском налазу и биохемијским анализама у складу са *COVID-19 упутством за збрињавање на нивоу примарне здравствене заштите.*

б) без блиског контакта (мање од 1 метар) у трајању дужем од 15 минута са особом код које је потврђено присуство SARS-CoV-2, тек када се код особе докаже присуство IgM антитела, применом брзих имунохроматографских тестова или хемилуминцентном методом;

- Место тестирања применом брзих имунохроматографских тестова, или хемилуминцентном методом, као и место узорковања за RT-PCR: **дом здравља**

3. Особе које се смештају у домове за стара лица и установе колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији

- **Место узорковања: дом здравља или болнице**

4. Држављани Републике Србије који нису испуњавали услове дефинисане индикацијама за RT-PCR тестирање, али су резултати серолошког тестирања (спроведеном о трошку државе или у комерцијалне сврхе) показали присуство IgM антитела.

- **Место узорковања: дом здравља**

5. Особе код којих је претходно потврђена болест COVID-19, након спроведеног лечења и регресије симптома и знакова болести:

- Прво узимање бриса за тестирање се врши у болничким условима и ако је тест негативан, особа се отпушта у кућну изолацију у трајању од 14 дана. Након истока периода куће изолације, потребно је спровести још једно тестирање. Два негативна теста на присуство SARS-CoV-2 генома вируса означавају оздрављење од COVID-19. дз

- **Место узорковања: дом здравља**

Б. Серолошко тестирање о трошку државе на присуство антитела на SARS- CoV-2 вирус укључује следеће групе:

1. Особе чије здравствено стање захтева хоспитализацију * (неукључујући амбулантне прегледе и дневне болнице)

- Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова или хемилуминисцентном методом
- Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR налаз негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним.

- Место тестирања:

а) дом здравља (истовремено када се издаје и упут за болничко лечење)

б) болнице (у случају пријема због ургентног стања пацијента)

2. Особе које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на респираторном и горњем дигестивном тракту (бронхоскопија, гастроскопија, спирометрија...)**

- Место тестирања:

а) дом здравља (истовремено када се издаје и упут за болничко лечење)

б) болнице (у случају пријема због ургентног стања пацијента)

- Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова или хемилуминисцентном методом.
- Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR налаз негативан, а здравствени радник

* НАПОМЕНА: Особама чије здравствено стање захтева хоспитализацију без обзира на одељење на које се примају се **рутински НЕ РАДИ** тестирање RT-PCR методом.

НАПОМЕНА: Особама које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на респираторном и горњем дигестивном тракту се **рутински НЕ РАДИ тестирање RT-PCR методом.

нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним.

- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или болнице

3. Специфичне групе експонираних (нпр. запослени у градском саобраћају, геронтолошким центрима, војска, полиција, студенти смештени у студентски домовима, итд) након процене надлежне епидемиолошке службе

- Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова
- Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR налаз негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним.


- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља

В. COVID-19 тестирање у комерцијалне сврхе:

1. Држављани Републике Србије који напуштају територију Републике Србије, а не испуњавају бар једну од наведених индикација за тестирање о трошку државе. Начин тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописаним у земљи у коју особа путује.
 - Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља
2. Сви путници у међународном саобраћају који напуштају територију Републике Србије. Начин тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописаним у земљи у коју особа путује.
 - Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља
3. Групни захтеви лица запослених у правном субјекту (серолошки тест и/или RT-PCR) уз претходну најаву и потврду лабораторија да имају капацитет да обраде узорке
 - Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља
4. Појединачни захтеви (серолошки тест и/или RT-PCR)
 - Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља

2. Обавезује се Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” да закључак, као нови Прилог 17. Упутства - **COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ** достави свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа Републике Србије.

В. Д. ДИРЕКТОРА


Доц. др Верица Јовановић